

LITONID

Pulbere pentru soluție orală



SUPLIMENT ALIMENTAR

Compoziție:

Ingrediente active	Cantitatea/plic	%, VNR
Citrat de tri-potasiu monohidrat (Potasiu)	1580 mg (14,6 mEq) (571 mg)	28,5%
Citrat de tri-magneziu nonahidrat (Magneziu)	841 mg (8,2 mEq) (100 mg)	26,7%
L-metionină	500 mg	*

* Valoarea nutrițională de referință (VNR) nu a fost stabilită.

Ingrediente: citrat de tri-potasiu monohidrat; citrat de tri-magneziu nonahidrat; corector de aciditate: acid citric anhidru; agent de încărcare: maltodextrină; **L-metionină**; aromă de portocale; îndulcitor: sucraloză.

Litonid este un supliment alimentar ce ajută la menținerea unui pH urinar echilibrat, care poate fi important în prevenirea formării calculilor renali. **Litonid** conține potasiu (sub formă de citrat tribazic de potasiu), care poate ajuta la creșterea pH-ului urinar, creând astfel un mediu mai puțin favorabil pentru formarea calculilor renali. De asemenea, L-metionina, un alt ingredient din compoziția **Litonid**, poate ajuta la reducerea formării cristalelor de acid uric care pot duce, de asemenea, la formarea calculilor renali.

Beneficii:

- Contribuie la prevenirea formării calculilor renali și infecțiilor urinare.
- Ajută la menținerea unui sistem urinar sănătos și echilibrat.
- Ajută la menținerea tensiunii arteriale normale și la buna funcționare a inimii.

Modul de utilizare:

Adulți: 1 plic (4,8 g) de 1-2 ori/zi, dimineața și seara. Conținutul fiecărui plic se dizolvă în 150-200 ml de apă. Se recomandă administrarea produsului în timpul sau la 30 de minute după masă. Se recomandă utilizarea de durată, timp de cel puțin 3 luni.

1. Pentru eliminarea calculilor de dimensiuni mici (1-5 mm) sau microlitiază renală: 1 plic de 2 ori pe zi, dimineața și seara, timp de 3 luni sau până la eliminarea completă.
2. În cazul indicației de litotritie: înainte - 1 plic seara, timp de 1 lună. După - 1 plic de 2 ori pe zi, dimineața și seara, timp de minim 3 luni.
3. Pentru pacienți cu predispoziție sau recidive frecvente: 1 plic pe zi, timp de 3 luni, 2 cure pe an.

Contraindicații:

Administrarea este contraindicată la pacienții cu hiperkaliemie sau cu afecțiuni care predispun la hiperkaliemie. Aceste afecțiuni includ insuficiența cardiacă cronică, insuficiență renală severă, diabet zaharat necontrolat sau deshidratare acută (de exemplu, cauzată de diaree sau efort fizic intens). Nu trebuie administrat împreună cu diuretice economisitoare de potasiu.

Păstrare:

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Precauții:

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

A nu se consuma dacă sunteți alergic la unul din ingrediente.

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.

Femeile însărcinate sau care alăptează și persoanele care iau medicamente sau suferă de o problemă medicală, ar trebui să consulte medicul înainte de a utiliza acest produs.

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.

Acest produs nu este medicament.

Forma de comercializare a produsului:

Câte 4,8 g pulbere pentru soluție orală în plicuri. Câte 30 plicuri în cutie pliantă de carton, împreună cu prospectul pentru utilizare.

Producător, deținătorul certificatului de înregistrare în Republica Moldova:

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova

tel.: +(373) 22 53 61 60

Deținător notificare în România:

GABA OPTIFARM S.R.L.

str. 1 decembrie 1918, nr. 46, ap. 31, or. Brașov, România

tel.: +(40) 746 488 222

ЛИТОНИД

Порошок для приготовления
раствора для приема внутрь



ДОБАВКА К ПИЩЕ

Состав:

Активные ингредиенты	Содержание в 1 пакетике	%, РНП
Три-калия цитрат моногидрат (Калий)	1580 мг (14,6 мEq) (571 мг)	28,5%
Три-магния цитрат нонагидрат (Магний)	841 мг (8,2 мEq) (100 мг)	26,7%
L-метионин	500 мг	*

* Рекомендуемая норма потребления (РНП) не определена.

Ингредиенты: три-калия цитрат моногидрат; три-магния цитрат нонагидрат; регулятор кислотности: лимонная кислота безводная; объемобразующий агент: мальтодекстрин; L-метионин; ароматизатор апельсин; подсластитель: сукралоза.

Литонид — это добавка к пище, поддерживающая сбалансированный уровень pH мочи, что имеет важное значение для предотвращения образования камней в почках. **Литонид** содержит калий (в форме трехосновного цитрата калия), который может способствовать повышению pH мочи, тем самым создавая менее благоприятную среду для образования камней в почках. Кроме того, L-метионин, другой ингредиент **Литонида**, может помочь уменьшить образование кристаллов мочевой кислоты, также способствующие камнеобразованию в почках.

Преимущества:

- Способствует предотвращению образования камней в почках и инфекций мочевыводящих путей.
- Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
- Помогает поддерживать нормальное кровяное давление и сердечную функцию.

Способ применения:

Взрослые: по 1 пакетик 1-2 раза в день, утром и вечером. Содержимое пакетика растворяют в 150-200 мл воды. Рекомендуется принимать во время или через 30 минут после приема пищи. Рекомендуется длительное применение продукта в течение не менее 3 месяцев.

1. Для выведения мелких камней (1-5 мм) или микролитиаз почек: по 1 пакетик 2 раза в день, утром и вечером, в течение 3 месяцев или до полного выведения.
2. Показания к литотрипсии: перед процедурой - по 1 пакетик вечером, в течение 1 месяца. После - по 1 пакетик 2 раза в день, утром и вечером, в течение не менее 3 месяцев.
3. Для пациентов с предрасположенностью или частыми рецидивами: по 1 пакетик в день, в течение 3 месяцев, 2 курса в год.

Противопоказания:

Применение противопоказано пациентам с гиперкалиемией или состояниями, предрасполагающими к гиперкалиемии. К таким состояниям относятся хроническая сердечная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность, неконтролируемый сахарный диабет или острое обезвоживание (например, вызванное диареей или интенсивной физической нагрузкой). Так же не следует назначать вместе с калийсберегающими диуретиками.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке.

Предупреждения:

Не использовать добавку к пище в качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не превышать рекомендуемую дозу суточного потребления. Не использовать при аллергии на составляющие компоненты продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беременным или кормящим женщинам, лицам, страдающим заболеваниями или принимающим лекарства, следует проконсультироваться с врачом перед использованием продукта. Употребить, предпочтительно, до истечения срока годности, указанного на упаковке. Данный продукт не является лекарством.

Форма выпуска и упаковка:

По 4,8 г порошка для приготовления раствора для приема внутрь в пакетике. По 30 пакетиков вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Производитель, владелец сертификата о регистрации в Республике Молдова:

КП "Балкан Фармасьютикалс" ООО

ул. Индустриальная, 7/А, MD-2091, г. Сынжеря, Республика Молдова
тел.: +(373) 22 53 61 60

Владелец регистрационного удостоверения в Румынии:

GABA OPTIFARM S.R.L.

ул. 1 декабря 1918, 46, кв. 31, г. Брашов, Румыния
тел.: +(40) 746 488 222