

INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

Supliment alimentar

VASORUTIN

comprimate

DENUMIRE COMERCIALĂ

VASORUTIN

COMPOZIȚIE

Un comprimat conține: acid ascorbic 50 mg, rutozidă (rutină) 50 mg; excipienți: zahăr, amidon de cartofi, polivinilpirolidonă (stabilizator), stearat de magneziu (agent antiaglomerant).

DESCRIEREA SUPLIMENTULUI ALIMENTAR

Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare galben-verzuie, cu incluziuni neînsemnate.

PREZENTARE AMBALAJ

Blistere a câte 10 comprimate. Câte 3 sau 10 blistere în cutie pliantă de carton.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturi sub 25 °C. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.
A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI

SC "Balkan Pharmaceuticals" SRL,
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
Tel: (+373) 22 53 61 60

ADNOTARE LA SUPLIMENTUL ALIMENTAR

VASORUTIN este un supliment alimentar conceput pentru înlăturarea deficienței acidului ascorbic (vitamina C) și rutozidei în organism. Remediul combinat, acțiunea căruia este determinată de efectele componentelor sale. Majoritatea efectelor rutozidei, care este un bioflavonoid, denumit și vitamina P, sunt mediate de către acidul ascorbic. Rutozida în asociere cu acidul ascorbic reduce permeabilitatea și fragilitatea capilarelor, fortifică peretele celular, posedă efect antiinflamator, are proprietăți antioxidante, participă la procesele de oxidoreducere și contribuie la depozitarea acidului ascorbic în țesuturi.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZARE

Hipovitaminoza C și P
Permeabilitatea crescută a capilarelor.
Fortificarea sistemului imunitar.

MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează intern, după mese. Comprimatele se vor înghiți întregi, cu o cantitate suficientă de apă.

Adulți

Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi.

Copii peste 3 ani

Câte ½-1 comprimat pe zi.

Înainte de administrare consultați medicul.

REAȚII ADVERSE

Reacții alergice la componentele produsului, cefalee, la administrarea îndelungată a dozelor mari - probleme la nivelul sistemului digestiv (pirozis, greață, vărsături, diaree), la nivelul rinichilor (pietre la rinichi), tulburări de somn, hiperexcitabilitate.

CONTRAINDICAȚII

Copii sub 3 ani. Trimestrul I de sarcină. Hipersensibilitate la componentele produsului, hipercoagulare sanguină, predispunere la tromboze, tromboflebite, diabet zaharat, urolitiază cu formarea de calculi urați, maladii renale severe.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Administrarea produsului concomitent cu consumul de băuturi alcaline, fructe proaspete sau sucuri de legume reduce absorbția vitaminei C. Conține zahăr. Persoanele cu afecțiuni ereditare de intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză sau insuficiență a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest produs. În timpul sarcinii și în perioada de alăptare produsul se administrează doar după consultarea medicului.

Vă dorim să fiți sănătoși!

Acest produs nu este medicament.

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului, înscris pe ambalaj.