

INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE

FURACILINĂ

20 mg

Comprimate

COMPOZIȚIA

1 comprimat conține nitrofurul 20 mg.

Excipienți: clorură de sodiu.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Comprimate rotunde de culoare galbenă, biconvexe, cu aspect uniform, structura compactă și omogenă, cu incrustație „BP” pe una din fețe.

Se admite o marmoritate pe suprafața comprimatelor.

PROPRIETĂȚI

Furacilina are un spectru larg de activitate asupra unor variate grupuri de microorganisme gram-pozitive și gram-negative, inclusiv unele specii și tulpini *Aerobacter aerogenes*, *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Streptococcus pneumoniae*, *Erysipelothrix insidiosus*, *Escherichia coli*, *Gardnerella vaginalis* (formerly *Haemophilus vaginalis*), *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella lacunata*, *Neisseria*, *Paracolobactrum*, *Proteus*, *Serratia marcescens*, *Salmonella*, *Shigella*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* Furacilina nu este deosebit de activă împotriva celor mai multe tulpini de *Pseudomonas aeruginosa* și nu inhibă fungi și virusurile. Inhibă o serie de enzime bacteriene implicate în metabolismul aerob și anaerob al glucozei și piruvatului (piruvatdehidrogenaza, citrat-sintetaza, malat-dehidrogenaza, glutationreductaza și piruvat-decarboxilaza) și cauzează dereglări ale ciclului pentozofosfaților.

La utilizarea topică a furacilinei în concentrație a soluției de 13-20 μg/ml, împotriva germenilor sensibili dezvoltă efect bactericid, proprietatea de inhibare a germenilor sensibili o dezvoltă la concentrația de 5-10 μg/ml. Furacilina poate fi activă împotriva organismelor care au dezvoltat rezistență la antibiotice și sulfonamide.

MOD DE UTILIZARE

Se utilizează extern în plăgi supurate ale pielii și mucoaselor, ulcere, arsuri infectate de gradul II și III, infecții anaerobe ale plăgilor, osteomieliță, empiem pleural, otită medie și externă supurată, furuncul al urechii medii și externe, empiem al sinusurilor paranazale, prevenirea infecției de grefe de piele și/sau donatori înainte sau după chirurgie, escare, gargarisme în stomatită, tonsilită.

Furacilina se utilizează extern sub formă de soluție apoasă de 0,02% (1:5000) și soluție alcoolică de 0,066% (1:1500, se utilizează alcool etilic de 70%). Pentru dizolvarea rapidă se utilizează apă caldă sau fierbinte, iar apoi soluția se răcește la temperatura camerei. Soluția se poate depozita pe o perioadă de maxim 10 zile.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

În utilizarea topică se pot dezvolta dermatoze alergice, manifestate prin urticarie, prurit, erupții cutanate.

La utilizarea orală accidentală pot să apară grețuri și vomă.

Tratament: vomă indusă sau lavaj gastric.

Administrarea de lichide în cantități mari pentru accelerarea eliminării cu urina.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate. Câte 10 comprimate în blistere cu instrucțiunea de utilizare.

PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

str. Industrială, 7/A, MD-2091,

or. Sîngera, Republica Moldova



www.balkanpharmaceuticals.com